

癌腫：非小細胞肺癌

レジメン名：CDDP+PEM+Nivolumab(NAC)

運用開始日：2023/05/23

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55
2	生理食塩液注	50mL	5分	9:00
3	ニボルマブ	360mg	30分	9:05
	生理食塩液注	100mL		
4	硫酸Mg補正液	8mL	60分	9:35
	ソルデム3A輸液	500mL		
5	ソルデム3A輸液	500mL	60分	10:35
6	パロノセトロン注	0.75mg	15分	11:35
	デキサメタゾン注	9.9mg		
	生理食塩液注	50mL		
7	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	11:50
	生理食塩液注	100mL		
8	D-マンニトール20%	200mL	60分	12:00
9	シスプラチン	75mg/m ²	60分	13:00
	生理食塩液注	100mL		
10	生理食塩液注	500mL	60分	14:00
11	生理食塩液注	500mL	60分	15:00

インターバル：21日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服。

・デキサメタゾンはday2～3に8mg内服。

・PEM初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/dayを連日服用する

・PEM初回投与の少なくとも7日前にビタミンB₁₂1mg/回を筋肉注射し、その後約9週ごと(3サイクルごと)に1回投与する