



癌腫：食道がん

レジメン名：5-FU/CDDP(700/70)+RT(アプレピタント併用)

運用開始日：2023/06/13

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日				
				day1	day2	day3	day4	day5
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:50	—	—	—	—
2	生理食塩液注	50mL	5分	8:55	—	—	—	—
3	生理食塩液注	50mL	5分	—	—	—	—	9:00
4	フルオロウラシル	700mg/m <sup>2</sup>	24時間	9:00	9:00	9:00	9:00	—
	生理食塩液注	500mL						
5	ソルデム3A輸液	500mL	120分	◇9:00	—	—	—	—
	硫酸Mg補正液	8mL						
6	ソルデム3A輸液	500mL	120分	◇11:00	—	—	—	—
7	パロノセトロン注	0.75mg	30分	◆12:30	—	—	—	—
	デキサメタゾン注	9.9mg						
	生理食塩液注	50mL						
8	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	120分	◇13:00	—	—	—	—
	生理食塩液注	300mL						
9	ソルデム3A輸液	500mL	120分	◇15:00	—	—	—	—
10	D-マンニトール20%注	300mL	180分	◆16:00	—	—	—	—
11	ソルデム3A輸液	500mL	120分	◇17:00	—	—	—	—
12	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	—	◆9:00	◆9:00	—	—
	生理食塩液注	50mL						
13	生理食塩液注	500mL	120分	—	◇9:00	◇9:00	—	—
14	ソルデム3A輸液	500mL	120分	—	◇11:00	◇11:00	—	—
15	ソルデム3A輸液	500mL	120分	—	◇13:00	◇13:00	—	—
16	生理食塩液注	500mL	120分	—	◇15:00	◇15:00	—	—

インターバル：28日

備考：◇：側管1, ◆：側管2から投与

・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服。