

癌腫：非小細胞肺がん

レジメン名：CDDP+PEM+Tremelimumab+Durvalumab(POSEIDON)

運用開始日：2023/12/22

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55
2	生理食塩液注	50mL	5分	9:00
3	トレメリムマブ	75mg	60分	9:05
	生理食塩液注	100mL		
4	生理食塩液注	50mL	5分	10:05
5	デュルバルマブ	1500mg	60分	10:10
	生理食塩液注	100mL		
6	硫酸Mg補正液	8mL	60分	11:10
	ソルデム3A輸液	500mL		
7	ソルデム3A輸液	500mL	60分	12:10
8	パロノセトロン注	0.75mg	15分	13:10
	デキサメタゾン注	9.9mg		
	生理食塩液注	50mL		
9	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	13:25
	生理食塩液注	100mL		
10	D-マンニトール20%	200mL	60分	13:35
11	シスプラチン	75mg/m ²	60分	14:35
	生理食塩液注	100mL		
12	生理食塩液注	500mL	60分	15:35
13	生理食塩液注	500mL	60分	16:35

インターバル：21日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服

- ・PEM初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/dayを連日服用する
- ・PEM初回投与の少なくとも7日前にビタミンB₁₂1mg/回を筋肉注射し、その後約9週ごと(3サイクルごと)に1回投与する
- ・5コース目はデュルバルマブとペメトレキセドのみ、4週後の6コース目はデュルバルマブとトレメリムマブとペメトレキセドのみ、7コース目以降は4週ごとにデュルバルマブとペメトレキセドのみ投与