



NTT Medical Center Tokyo

癌腫：非ホジキンリンパ腫

レジメン名：GCD-R

運用開始日：2022/05/26

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日	
				day1	day8
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	9:25	9:55
2	デキサメタゾン注	33mg	30分	9:30	—
	生理食塩液注	100mL			
3	グラニセトロン注	3mg/50mL	10分	10:00	10:00
4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	10:10	10:10
	ブドウ糖注5%	100mL			
5	カルボプラチン	5AUC	60分	10:40	—
	生理食塩液注	250mL			
6	生理食塩液注	50mL	5分	11:40	14:15
7	d-クロルフェニラミン注	5mg	5分	—	10:40
	デキサメタゾン注	16.5mg			
	生理食塩液注	50mL			
8	リツキシマブ	375mg/m ²	240分	—	10:45
	生理食塩液注	500mL			

インターバル：21日

備考：・ day2-4デカドロン錠40mg/日内服

【リツキシマブ投与速度】

初回) 0-1時間：25mL/h, 1-2時間：100mL/h, 2時間以降：200mL/h

2回目以降) 0-1時間：100mL/h, 1時間以降：200mL/h