

内视镜检查时希望使用镇静剂者须知

使用镇静剂会让人感到困倦，从而能够较为轻松地接受检查。

（并不是完全入睡。药效因人而异。）

但是，作为副作用，可能会出现呼吸变弱、血压下降、身体不稳等，对身体造成较大负担。为了确保安全接受检查，可能会有无法使用镇静剂的情况。此外，事前还有一些需要注意的事项（如下所示）。



检查结束后，我们会观察您1~2小时，确认您没有身体不稳、意识清醒后，才会让您回家，因此，回家的时间会比平时稍晚。

<以下情况者不能使用镇静剂>

- 75岁以上者
 - 睡眠时无呼吸综合症
 - 高度肥胖（BMI ≥ 35 ）
 - 重度高血压
 - 急性呼吸困难
 - 长期服用抗精神类药物者或酒精中毒等药物依赖者
 - 精神状态不稳定导致无法配合检查
 - 患有重度全身性疾病、呼吸系统及循环系统的维持能力降低
 - 以前使用镇静剂时身体出现异常者（过敏、血压降低、血氧饱和度降低等等）
 - 穿着以下款式的鞋子者，在使用镇静剂后容易摔倒
- 当天早上服用了糖尿病药者
 - 孕妇、哺乳中
 - 急性闭角型青光眼
 - 循环动态不安定、心不全、不安定狭心症
 - 容易发生误咽者
- 肾功能障碍、肾衰竭、透析患者
 - 步行不稳者
 - 重度心律不齐、电解质异常
 - 严重肌无力者
 - 药物中毒

露跟鞋・拖鞋・人字拖鞋・厚底鞋・高跟鞋跟高3cm以上

后跟带是可反转可活动款式的凉鞋和拖鞋等



（※请使用像运动鞋一样平底，足部可以被全部覆盖的鞋子）

<镇静剂使用须知>

- 由于检查后24小时药效仍在，禁止驾驶汽车、摩托车、自行车等交通工具，也禁止饮酒。
- 回家后可能仍会出现头晕、嗜睡、头重感等症状。
- 当天请勿泡澡，仅限淋浴。
- 由于当天可能会出现记忆障碍（健忘）的症状，请不要安排需要做出中药判断的会议或工作。
- 若因检查引起异常二就诊（包括本院），需自费承担通常的保险医疗费用。
- 例如：注射部位的静脉炎（发红或疼痛）等。
- 有些检查无法在同一天进行，如记忆力检查、负荷心电图等。
- 若为2天体检套餐者，负荷心电图将改为第二天进行，因此回家时间可能会延后。
- 建议尽量由陪同人员一同返回。

※需要额外收费