

薬剤部:よくある質問

お薬についてわからないこと、心配なことはありませんか？

【質問1】他の病院からお薬をもらっているけれど、関東病院から新たにもらった薬と一緒に飲んでもよいですか？

【回答1】お薬によっては併用するとお薬の効果が弱くなったり、副作用が強く現れたりすることがあります。薬剤師がお薬どうしの影響を確認します。お薬の効果や副作用に影響がある場合は、影響の少ないお薬に変更したり、お薬の量を調節したりすることがあります。

【質問2】市販の薬を買って飲みたいけれど、今飲んでいる薬と一緒に飲んでもよいですか？

【回答2】お薬によっては併用するとお薬の効果が弱くなったり、副作用が強く現れたりすることがあります。薬剤師が服用中のお薬への影響を確認しますので、市販の薬を飲み始める前にご相談ください。

【質問3】1日1回飲むように言われたけれど、間違っって1日3回飲んでしまいました。どうしたらよいですか？

【回答3】重篤な症状が現れた場合、あるいは重篤な症状が現れる可能性がある場合は受診していただくことがあります。お気づきになった時点で早めにご相談ください。

【質問4】新しくもらった薬を飲み始めたら、気持ちが悪くなってきました。(あるいは、発疹、かゆみが出ました。)

【回答4】上記の症状に限らず、お薬を飲み始めて気になる症状が現れた場合は、早めにご相談ください。お薬の種類を変更したり、お薬の量を調節したり、副作用を予防する薬を使用したりする必要がある場合があります。また、自己判断で服用を中止すると病状が悪化することがありますので、必ずご相談ください。

【質問5】薬を飲んだら、吐いてしまいました。吐いた分の薬は追加して飲んだほうがよいでしょうか？

【回答5】お薬を吐いてしまった場合、追加して服用する必要がある場合とない場合があります。お薬や病状によって対応が異なりますのでご相談ください。