



NTT Medical Center Tokyo

癌腫:神経内分泌腫瘍

レジメン名：STZ+5-FU（daily）

運用開始日：2022/01/28

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日				
				day1	day2	day3	day4	day5
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55	8:55	8:55	8:55
2	生理食塩液注	500mL	60分	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
3	パロノセトロン注	0.75mg	30分	10:00	—	—	—	—
	デキサメタゾン注	9.9mg						
	生理食塩液注	50mL						
4	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	—	10:00	10:00	10:00	10:00
	生理食塩液注	50mL						
5	フルオロウラシル	400mg/m ²	30分	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30
	生理食塩液注	100mL						
6	生理食塩液注	50mL	5分	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
7	ストレプトゾシン	500mg/m ²	30分	11:05	11:05	11:05	11:05	11:05
	生理食塩液注	100mL						
8	生理食塩液注	250mL	30分	11:35	11:35	11:35	11:35	11:35

インターバル：42日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服