

癌腫：尿路上皮がん

レジメン名：GEM+CDDP

運用開始日：2022/12/19

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日			
				day1	day2	day8	day15
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	10:55	8:55	10:55	10:55
2	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	11:00	—	11:00	11:00
	生理食塩液注	50mL					
3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	11:30	—	11:30	11:30
	生理食塩液注	100mL					
4	生理食塩液注	50mL	5分	12:00	—	—	—
5	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	12:05	—	—	—
6	硫酸Mg補正液	8mL	1時間	—	9:00	—	—
	ソルデム3A輸液	500mL					
7	ソルデム3A輸液	500mL	1時間	—	10:00	—	—
8	パロノセトロン注	0.75mg	30分	—	11:00	—	—
	デキサメタゾン注	9.9mg					
	生理食塩液注	50mL					
9	シスプラチン	70mg/m ²	120分	—	11:30	—	—
	生理食塩液注	500mL					
10	D-マンニトール20%	200mL	30分	—	13:30	—	—
11	生理食塩液注	500mL	1時間	—	14:00	—	—
12	ソルデム3A輸液	500mL	1時間	—	15:00	—	—
13	生理食塩液注	50mL	5分	—	—	12:00	12:00

インターバル：28日

備考：・◇：側管1から投与

- ・アプレピタントはday2に125mg、day3～4に80mgを内服
- ・デキサメタゾンはday3～4に8mgを内服