

癌腫：胚細胞腫瘍

レジメン名：BEP療法

運用開始日：2020/02/20

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日						
				day1	day2	day3	day4	day5	day8	day15
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55	8:55	8:55	8:55	8:55	8:55
2	ソルデム3A輸液	500mL	120分	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	—	—
	硫酸Mg補正液	8mEq								
3	ソルデム3A輸液	500mL	120分	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	—	—
4	パロノセトロン注	0.75mg	30分	13:00	—	—	—	—	—	—
	デキサメタゾン注	9.9mg								
	生理食塩液注	50mL								
5	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	—	13:00	13:00	13:00	13:00	—	—
	生理食塩液注	50mL								
6	シスプラチン	20mg/m ²	120分	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	—	—
	生理食塩液注	500mL								
7	D-マンニトール20%	200mL	60分	15:30	15:30	15:30	15:30	15:30	—	—
8	ソルデム3A輸液	500mL	120分	15:30	15:30	15:30	15:30	15:30	—	—
9	エトポシド	100mg/m ²	60分	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	—	—
	ブドウ糖液5%	500mL								
10	生理食塩液注	50mL	5分	—	—	—	—	—	9:00	9:00
11	プレオマイシン	30mg	30分	18:30	—	—	—	—	9:05	9:05
	生理食塩液注	100mL								
12	生理食塩液注	50mL	5分	—	—	—	—	—	9:35	9:35
13	ソルデム3A輸液	500mL	120分	19:00	18:30	18:30	18:30	18:30	—	—
14	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	21:00	20:30	20:30	20:30	20:30	—	—

インターバル：21日

備考：・アブレヒタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服

・プレオマイシンは、day2,9,16に投与することもある