

癌腫：胚細胞腫瘍

レジメン名：PE療法

運用開始日：2020/02/20

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日				
				day1	day2	day3	day4	day5
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55	8:55	8:55	8:55
2	ソルデム3A輸液☒	500mL	120分	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
	硫酸Mg補正液	8mEq						
3	ソルデム3A輸液	500mL	120分	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
4	パロノセトロン注	0.75mg	30分	13:00	—	—	—	—
	デキサメタゾン注	9.9mg						
	生理食塩液注	50mL						
5	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	—	13:00	13:00	13:00	13:00
	生理食塩液注	50mL						
6	シスプラチン	20mg/m ²	120分	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30
	生理食塩液注	500mL						
7	D-マンニトール20%注射液	200mL	60分	15:30	15:30	15:30	15:30	15:30
8	ソルデム3A輸液	500mL	120分	15:30	15:30	15:30	15:30	15:30
9	エトポシド	100mg/m ²	60分	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30
	ブドウ糖液5%	500mL						
10	ソルデム3A輸液	500mL	120分	18:30	18:30	18:30	18:30	18:30
11	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	20:30	20:30	20:30	20:30	20:30

インターバル：21日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服