



## NTT Medical Center Tokyo

癌腫：非ホジキンリンパ腫

レジメン名：R-CHOP

運用開始日：2021/10/28

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	9:55
2	d-クロルフェニラミン注	5mg	5分	10:00
	プレドニゾン注	60mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注	50mL		
3	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	205分	10:05
	生理食塩液注	500mL		
4	グラニセトロン注	3mg/50mL	10分	13:30
5	ビンクリスチン	1.4mg/m <sup>2</sup> (Max2mg)	5分	13:40
	生理食塩液注	50mL		
6	ドキシソルピシン	50mg/m <sup>2</sup>	5分	13:45
	生理食塩液注	10mL		
7	シクロホスファミド	750mg/m <sup>2</sup>	30分	13:50
	生理食塩液注	100mL		
8	生理食塩液注	50mL	5分	14:20

インターバル：21日

備考：・プレドニゾン錠 day2～5 内服

【リツキシマブ投与速度】

【初回】0-1時間：25mL/h, 1-2時間：100mL/h, 2時間以降：200mL/h

【2回目以降（前回infusion reactionが発現しなかった場合）】0-1時間：100mL/h, 1時間以降：200mL/h