



NTT Medical Center Tokyo

癌腫：非ホジキンリンパ腫

レジメン名：Bendamustine+Obinutuzumab

運用開始日：2022/03/21

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日	
				day1	day2
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55
2	d-クロルフェニラミン注	5mg	30分	9:00	-
	デキサメタゾン注	16.5mg			
	生理食塩液注	50mL			
3	オビヌツズマブ	1000mg/body	195分	9:30	-
	生理食塩液注	210mL			
4	パロノセトロン注	0.75mg	10分	12:45	-
	生理食塩液注	50mL			
5	生理食塩液注	50mL	5分	-	9:00
6	ベンダムスチン	90mg/m ²	10分	12:55	9:05
	生理食塩液注	50mL			
7	生理食塩液注	50mL	5分	13:05	9:15

インターバル：28日

備考：・オビヌツズマブ投与30-60分前にアセトアミノフェン300-1000mg内服

・オビヌツズマブは1サイクル目はday1,8,15、2サイクル目以降はday1に投与

【オビヌツズマブ投与速度】

初回 12.5mL/hで開始し、状態を観察しながら30分毎に12.5mL/hずつ最大100mL/hまで変更可

①コース目day8.15 0-30分：25mL/h, 30-60分：50mL/h, 60-90分：75mL/h, 90分以降：100mL/h

②コース目以降 0-30分：25mL/h, 30分以降：225mL/h