



癌腫：非ホジキンリンパ腫

レジメン名：Polatuzumab vedotin+Bendamustine+Rituximab

運用開始日：2022/03/21

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日	
				day1	day2
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55
2	d-クロルフェニラミン注	5mg	5分	9:00	—
	デキサメタゾン注	16.5mg			
	生理食塩液注	50mL			
3	生理食塩液注	50mL	10分	—	9:00
4	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	205分	9:05	—
	生理食塩液注	500mL			
5	ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	30分	12:30	—
	生理食塩液注	80mL			
6	パロノセトロン注	0.75mg	10分	13:00	—
	生理食塩液注	50mL			
7	ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	10分	13:10	9:10
	生理食塩液注	50mL			
8	生理食塩液注	50mL	5分	13:20	9:20

インターバル：21日

備考：・【リツキシマブ投与速度】

初回) 0-1時間：25mL/h, 1-2時間：100mL/h, 2時間以降：200mL/h

2回目以降) (前回infusion reactionが発現しなかった場合) 0-1時間：100mL/h, 1時間以降：200mL/h

・【ポラツズマブ ベドチン投与速度】

初回は90分間で投与。忍容性が良好であれば2回目以降30分に短縮できる