



NTT Medical Center Tokyo

癌腫：非ホジキンリンパ腫

レジメン名：Polatuzumab vedotin + R-CHP

運用開始日：2022/08/25

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55
2	d-クロルフェニラミン注	5mg	5分	9:00
	プレドニゾン注	100mg		
	生理食塩液注	50mL		
3	リツキシマブ	375mg/m ²	360分	9:05
	生理食塩液注	500mL		
4	ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	90分	15:05
	生理食塩液注	80mL		
5	グラニセトロン注	3mg/50mL	10分	16:35
6	ドキシソルピシン	50mg/m ²	5分	16:45
	生理食塩液注	10mL		
7	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分	16:50
	生理食塩液注	100mL		
8	生理食塩液注	50mL	5分	17:20

インターバル：21日

備考：・プレドニゾン錠 day2~5 内服

【リツキシマブ投与速度】

初回) 0-1時間：25mL/h, 1-2時間：100mL/h, 2時間以降：200mL/h

2回目以降) (前回infusion reactionが発現しなかった場合) 0-1時間：100mL/h, 1時間以降：200mL/h

【ポラツズマブ ベドチン投与速度】

初回は90分間で投与。忍容性が良好であれば2回目以降30分に短縮できる。

NTT東日本 関東病院
薬剤レジメン紹介