

癌腫：非小細胞肺がん

レジメン名：PEM+Bev

運用開始日：2017/08/25

| Rp | 薬剤名      | 用量                   | 投与時間   | 投与日   |
|----|----------|----------------------|--------|-------|
|    |          |                      |        | day1  |
| 1  | 生食注シリンジ  | 10mL                 | ワンショット | 8:55  |
| 2  | パロノセトロン注 | 0.75mg               | 30分    | 9:00  |
|    | デキサメタゾン注 | 6.6mg                |        |       |
|    | 生理食塩液注   | 50mL                 |        |       |
| 3  | ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 10分    | 9:30  |
|    | 生理食塩液注   | 100mL                |        |       |
| 4  | ペバシズマブ   | 15mg/kg              | 30分    | 9:40  |
|    | 生理食塩液注   | 100mL                |        |       |
| 5  | 生理食塩液注   | 50mL                 | 15分    | 10:10 |

インターバル：21日

備考：・ペバシズマブの点滴時間は2回目以降30分へ短縮可能

・PEM初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/dayを連日服用する

・PEM初回投与の少なくとも7日前にビタミンB<sub>12</sub>1mg/回を筋肉注射し、その後約9週ごと(3サイクルごと)に1回投与する