

癌腫：非小細胞肺癌

レジメン名：CDDP+PEM（day2以降DEX内服）

運用開始日：2020/02/18

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55
2	硫酸Mg補正液	8mL	60分	9:00
	ソルデム3A輸液	500mL		
3	ソルデム3A輸液	500mL	60分	10:00
4	パロノセトロン注	0.75mg	15分	11:00
	デキサメタゾン注	9.9mg		
	生理食塩液注	50mL		
5	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	11:15
	生理食塩液注	100mL		
6	D-マンニトール20%	200mL	60分	11:25
7	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	60分	12:25
	生理食塩液注	100mL		
8	生理食塩液注	500mL	60分	13:25
9	ソルデム3A輸液	500mL	60分	14:25
10	ソルデム3A輸液	500mL	60分	15:25

インターバル：21日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服

- ・デキサメタゾンはday2～3に8mgを内服
- ・PEM初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/dayを連日服用する
- ・PEM初回投与の少なくとも7日前にビタミンB<sub>12</sub>1mg/回を筋肉注射し、その後約9週ごと(3サイクルごと)に1回投与する