

癌腫：非小細胞肺癌

レジメン名：CDDP+PEM

運用開始日：2020/02/18

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日				
				day1	day2	day3	day4	day5
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	—	—	—	—
2	硫酸Mg補正液	8mL	120分	9:00	—	—	—	—
	ソルデム3A輸液	500mL						
3	ソルデム3A輸液	500mL	120分	11:00	—	—	—	—
4	パロノセトロン注	0.75mg	15分	12:00	—	—	—	—
	デキサメタゾン注	9.9mg						
	生理食塩液注	50mL						
5	デキサメタゾン注	6.6mg	15分	—	9:00	9:00	—	—
	生理食塩液注	50mL						
6	デキサメタゾン注	3.3mg	15分	—	—	—	9:00	—
	生理食塩液注	50mL						
7	デキサメタゾン注	1.65mg	15分	—	—	—	—	9:00
	生理食塩液注	50mL						
8	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	12:15	—	—	—	—
	生理食塩液注	100mL						
9	シスプラチン	75mg/m ²	120分	13:00	—	—	—	—
	生理食塩液注	500mL						
10	生理食塩液注	500mL	120分	15:00	9:00	9:00	9:00	9:00
11	D-マンニトール20%	300mL	180分	16:00	—	—	—	—
12	ソルデム3A輸液	500mL	120分	17:00	11:00	11:00	11:00	11:00
13	ソルデム3A輸液	500mL	120分	19:00	13:00	13:00	13:00	13:00
14	生理食塩液注	500mL	120分	—	15:00	15:00	15:00	15:00
15	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	21:00	17:00	17:00	17:00	—

インターバル：21日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服

・PEM初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/dayを連日服用する

・PEM初回投与の少なくとも7日前にビタミンB₁₂1mg/回を筋肉注射し、その後約9週ごと(3サイクルごと)に1回投与する