

癌腫：大腸がん

レジメン名：FOLFIRI+Cmab

運用開始日：2019/09/26

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日	
				day1	day8
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55
2	パロノセトロン注	0.75mg	30分	9:00	—
	デキサメタゾン注	6.6mg			
	d-クロルフェニラミン注	10mg			
	生理食塩液注	50mL			
3	セツキシマブ	400mg/m ²	120分	9:30	—
	生理食塩液注	500mL			
4	生理食塩液注	100mL	60分	11:30	—
5	レボホリナート注	200mg/m ²	120分	12:30	—
	生理食塩液注	250mL			
6	イリノテカン塩酸塩	150mg/m ²	120分	12:30	—
	生理食塩液注	250mL			
7	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	14:30	—
	生理食塩液注	50mL			
8	生理食塩液注	50mL	5分	14:35	—
9	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	14:40	—
	ブドウ糖注5%	*** mL			
10	d-クロルフェニラミン注	10mg	30分	—	9:00
	生理食塩液注	50mL			
11	セツキシマブ	250mg/m ²	60分	—	9:30
	生理食塩液注	250mL			
12	生理食塩液注	100mL	60分	—	10:30
13	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	—	11:30

インターバル：14日

備考：・セツキシマブ投与量・投与時間は2コース目以降250mg/m²・60分（希釈液：生食250mL）

・Rp4の生理食塩液注は2コース目以降50mLへ減量・5分で投与