

癌腫：大腸がん

レジメン名：FOLFOXIRI+BV

運用開始日：2020/02/20

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:50
2	生理食塩液注	50mL	5分	8:55
3	ペバシズマブ	5mg/kg	90分	9:00
	生理食塩液注	100mL		
4	パロノセトロン注	0.75mg	30分	10:30
	デキサメタゾン注	9.9mg		
	d-クロルフェニラミン注	5mg		
	ファモチジン注	20mg		
	生理食塩液注	50mL		
5	イリノテカン塩酸塩	165mg/m ²	60分	11:00
	生理食塩液注	250mL		
6	レボホリナート注	200mg/m ²	120分	12:00
	ブドウ糖注5%	250mL		
7	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	12:00
	ブドウ糖注5%	250mL		
8	生理食塩液注	50mL	5分	14:00
9	フルオロウラシル	3200mg/m ²	48時間	14:05
	ブドウ糖注5%	*** mL		

インターバル：14日

備考：・ペバシズマブ点滴時間は2回目以降30分へ短縮可能

・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服

